


# ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА



## УШИБ КОНЕЧНОСТИ



Припухлость  
и гематома



Легкая боль  
при движении

## ПЕРЕЛОМ

- Острая боль
- Неестественное положение руки или ноги
- Быстро нарастающий отек в месте повреждения

### ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ:

- Кровотечение
- Наличие костных отломков в ране

## СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА



Потеря сознания



Провалы в памяти  
на момент травмы



Головокружение



Головная боль





Тошнота



Слабость,  
сонливость

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



■ На место ушиба, вывиха или перелома приложи холод. Вызови скорую помощь.

■ Обездвижь (иммобилизируй) поврежденную конечность. При этом фиксируй минимум два сустава при переломе (один ниже, другой - выше повреждения), три - при вывихе (поврежденный, выше и ниже повреждения).

■ Наложи шины или подручные средства без исправления положения конечности.


■ При отсутствии шин поврежденную ногу прибинтуй к здоровой ноге, проложив между ними мягкий материал; руку можно зафиксировать в согнутом положении и прибинтовать к туловищу.

■ При подозрении на травму позвоночника пострадавшего нельзя перемещать, ставить на ноги!

Придай пострадавшему положение лежа на твердой ровной поверхности, зафиксируй положение головы и шеи.

■ При подозрении на перелом таза придай пострадавшему положение на спине с полусогнутыми разведенными ногами.

■ При открытых переломах необходимо остановить кровотечение, наложить стерильную повязку на рану, затем проводить иммобилизацию.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ